

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y SALUD (Grado)

Septiembre, 2013

Modelo de Examen: A

Por favor conteste en la hoja de lectora óptica. Rellene todos sus datos. No olvide indicar en el apartado correspondiente el modelo de examen (sin este dato, el examen no será corregido). El código de la asignatura es 47510.

Las respuestas que considere verdaderas señálelas con una **A**, y las que considere falsas con una **B**. La fórmula de corrección es Aciertos -- Errores. Sólo se hace la media de las notas obtenidas en las dos pruebas presenciales si las dos están aprobadas.

Según la normativa vigente, cualquier reclamación sobre este examen debe realizarse por escrito.

1. Las situaciones que conllevan tareas monótonas son potencialmente estresantes aunque no conlleven riesgo físico
2. En el tratamiento de las dificultades para hablar en público, las intervenciones que en general han sido más eficaces son aquellas que se centran en una de las tres modalidades de respuesta
3. En el contexto de la prevención coronaria, los autoinformes que permiten una aplicación colectiva son los menos preferidos en la evaluación de la hostilidad y la ira
4. Entre las variables psicológicas que influyen en la conducta de ejercicio físico, se encuentran la ansiedad social específica y el apoyo social
5. En el contexto de la promoción de hábitos alimentarios saludables, es importante tener en cuenta los estímulos antecedentes en cuya presencia se presenta la conducta inapropiada
6. La inoculación del estrés no es una técnica útil para controlar la ira y la agresividad en los pacientes con adicciones
7. Cuando el déficit de activación se encuentre vinculado a un estado de indefensión y depresión, provocar estrés para conseguir el nivel de activación óptimo mediante objetivos ambiciosos es una estrategia de enorme utilidad

8. Las situaciones positivas sólo pueden ser estresantes en el caso de personas con miedo al éxito

9. Con pacientes esquizofrénicos, los programas de entrenamiento en habilidades sociales más generales suelen ser menos eficaces que los programas de entrenamiento en habilidades sociales específicas relacionadas con los síntomas y el manejo de la enfermedad

10. Uno de los principales aspectos de la prevención primaria del abuso sexual infantil, es enseñar a los niños que el abuso puede provenir tanto de un desconocido como de un conocido

11. En general, el nivel de activación óptimo es cuantitativamente más elevado en las mujeres que en los hombres

12. En el tratamiento de las adicciones con problemas de comorbilidad, se recomienda utilizar el modelo secuencial más que el modelo integracionista

13. La presión arterial diastólica es la que debe considerarse como indicador de riesgo coronario cuando sus valores son altos

14. La técnica de “prevención de respuesta” con jugadores patológicos, consiste en planificar las actividades diarias del paciente de forma que no se exponga a los estímulos del juego y pueda evitar la respuesta de jugar

15. La práctica o exposición a hablar en público, es un ingrediente esencial en la intervención para hablar en público

16. Los trastornos gastrointestinales suelen estar relacionados con el estrés o los hábitos poco saludables

17. A diferencia de la motivación, el estrés siempre propicia la presencia de un nivel de activación general excesivo que perjudica el máximo rendimiento

18. En el proceso de intervención psicológica para la promoción de hábitos alimentarios saludables, las técnicas de autoobservación y autorregistro contribuyen al desarrollo de la percepción de control

19. En los programas de cesación gradual para dejar de fumar, el objetivo es que, progresivamente, el fumador fortalezca su fuerza de voluntad

20. Las situaciones que conllevan tareas monótonas sólo son potencialmente estresantes cuando conllevan riesgo físico, pues existe el peligro de que decaiga la atención y aumente la probabilidad de accidentes laborales
21. En el tratamiento de las dificultades para hablar en público, las intervenciones que en general han sido más eficaces son aquellas que combinan diversas técnicas con el fin de abordar dos o más de las tres modalidades de respuesta
22. En el contexto de la prevención coronaria, los autoinformes que permiten una aplicación colectiva son los preferidos en la evaluación de la hostilidad y la ira
23. Entre las variables psicológicas que influyen en la conducta de ejercicio físico, se encuentra la ansiedad social específica pero no el apoyo social
24. En el contexto de la promoción de hábitos alimentarios saludables, no es importante tener en cuenta los estímulos antecedentes en cuya presencia se presenta la conducta inapropiada, puesto que se trata de informar sobre los hábitos correctos
25. En el tratamiento del juego patológico, los programas multimodales se centran en los niveles de respuesta motor y cognitivo, pero no en el psicofisiológico
26. Diversos estudios han mostrado la eficacia del “juego controlado” como alternativa terapéutica similar a los programas de “bebida controlada”
27. La prevención de recaídas relacionadas con una deficiente conducta alimentaria, será más probable si la intervención realizada ha sido dirigida a favorecer el autocontrol
28. Los tres grandes objetivos de los programas multicomponente para dejar de fumar son: aumento de la motivación y la percepción de autoeficacia, cesación del hábito, y mantenimiento de la abstinencia
29. En el tratamiento del estrés, incrementar la independencia de funcionamiento personal es una estrategia adecuada para reducir la dependencia de apoyos sociales inapropiados
30. Según Landoucer, el error cognitivo central del jugador patológico se apoya en las nociones concernientes al azar o aleatoriedad

2012/2013

GRADO

Junio A Junio C Septi A Septi (SR)

1	A	A	A	A
2	B	B	B	B
3	B	B	B	B
4	B	A	A	A
5	A	A	A	A
6	B	B	B	B
7	B	B	B	B
8	B	B	B	B
9	B	A	A	A
10	A	A	A	A
11	B	B	B	B
12	A	B	B	B
13	A	B	B	B
14	B	B	B	B
15	B	A	A	A
16	A	B	A	A
17	B	B	B	B
18	A	B	A	A
19	B	B	B	B
20	B	B	B	B
21	A	B	A	A
22	A	B	A	A
23	B	A	B	B
24	B	B	B	B
25	B	A	B	B
26	B	B	B	B
27	A	B	A	A
28	A	B	A	A
29	A	B	A	A
30	A	B	A	A